

Nederlandse Bestuivingscommissie

p/a Meelstraat 61

5025 KL Tilburg Tel: 013-5362666

E-mail: info@nederlandsebestuivingscommissie.nl

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

bankrekening: 1280.18.690 K.v.K. 09165626



De vuilboom als haagplant. L. Hensels

In imkerskringen is de vuilboom (*Frangula alnus*), van al onze inlandse heesters wel de meest bekende, omdat ze tot een der beste bijenvoedselplanten of drachtplanten behoort.

Een plant met vele volksnamen, zoals;

sporkehout, hondskers, honzehout, peggehout en duvelskeersj.

De vele volksnamen wijzen op de veelzijdige gebruikswaarden van deze plant. Men maakt er een goede kwaliteit tekenhoutschool van.

Het diende als grondstof voor het maken van buskruit. Het werd gebruikt om er klompen en schoenen mee te "pinnen". De gevlochten takken werden als hechtlaag gebruikt door de stucadoor. De korfimker spijlde zijn strokorven met de rechte twijgen van deze struik. De schors wordt als Rhamnusbast gebruikt als laxermiddel en als bestanddeel in slankheidpreparaten.

Van de bessen is bekend, dat ze een sterk laxerende werking hebben en waar dan ook de naam vuilboom op duidt, en gelden hierdoor als giftig.

De vele gebruiksmogelijkheden droegen er toe bij dat de vuilboom regelmatig werd verjongd. Een gevolg hiervan was, de veelvuldige groei van jonge rechte twijgen, die zeer rijk bloeien.

De vuilboom bloeit met korte onderbrekingen van eind mei tot in september, soms vier tot vijf maal

Voor de bijenteelt geldt de vuilboom als bijzonder waardevol. Bij de vele gebruikswaarden kan er nog een worden toegevoegd, n.l. het gebruik als haagplant.

In 1978 heeft men op de toenmalige proefbijenstand "Ambrosiushoeve" te Hilvarenbeek een windsingel aangelegd van vuilboom. Na een proefperiode van zeven jaar kon worden vastgesteld, dat het gebruik van vuilboom als haag en windsingel rond een fruitaanplant, haar nut ruimschoots heeft bewezen. Is niet gevoelig

voor bacterievuur of andere ernstige plantenziekten, Kan zeer goed tegen strenge winters.

De citroenvlinder, wiens rupsen leven van vuilboombladeren, heeft in de proefperiode, geen enkele schade

Veroorzaakt De vermeerdering van de vuilboom gebeurt door de rijpe, zwarte bessen te verzamelen en te stabiliseren. De aldus voorgekiemde zaden, kunnen in het voorjaar worden gezaaid.

Het gebruik van de vuilboom als haag kan een waardevolle bijdrage

betekenen tot een gezonde bijenteelt
L.Hensels.